

УДК 582.736(235.221)

Е.В. Антонюк

E. Antonyuk

ЗАМЕТКА ОБ *OXYTROPIS SETIFERA* KOM.NOTE ABOUT *OXYTROPIS SETIFERA* KOM.

В статье приводится полный диагноз *O. setifera* Kom., ранее известного только по типовому образцу из Китая. Вид так же является новым для республики Казахстан.

Во время экспедиционных работ на хребте Монрак (Восточный Казахстан) в конце мая 2000 года нами был собран интересный остролодочник из секции *Xerobia*.

При его определении возникли трудности, т. к. собранные экземпляры не подходили ни под одно из описаний, приведенных во флористических сводках (Васильченко, Федченко, 1948; Байтенов, 1961; Семиотрочева, 1962; Филимонова, 1983). При более детальной обработке выяснилось, что собранный в Казахстане остролодочник соответствует описанию *O. setifera* Kom., известного только по типовому листу (Синьцзянь, [Джунгарская Гоби], горы Куку-Сырхэ, Прж.). *O. setifera* приводится В.И. Грубовым в сводке “Растения Центральной Азии” (1998), но в ключе для определения видов существует ошибка, т. к. на типовом листе представлены только цветущие растения. По-видимому, автор предположил, что если *O. setifera* габитуально похож на *O. setosa* (Pall.) DC., то и бобы соответственно должны быть тоже твердыми, орешковидными, но у собранного нами растения бобы кожистые, вздутые.

Так как на данный момент существует только первоописание *O. setifera* (Komarov, 1914) без описания бобов, мы сочли целесообразным опубликовать полный, дополненный нами диагноз этого нового для Алтайской горной страны вида.

*O. setifera* Kom. (Sect. *Xerobia* Bunge subsect. *Ampulla* Vass.) 1914, Feddes Repert. 13 : 233.

Radix fusiformis caudiculi pausi densissimi basi petiolis emarcidis dense tecti, stipulae basi tantum petiolo adnae (petiolares) anguste lanceolatae longe ciliatae et villosae; folia petiolata setoso villosa 2–3 juga, foliola lanceolato linearia acuta vel oblongo lanceolata; scapi quam folia breviores vel aequantes, capitula subumbellata 3–6 flora; bracteae lanceolato lineares villosa-setosae breves, calyx tubulosus pilis nigris omnino destitutus, albo setosus; dentes triangulari-lineares longe ciliato-setosi calyce duplo breviores; petala lutea carinae rostrum elongatum falciforme alis aequans, ovarium sessile pilosum oblongo lanceolatum 10–15 ovulatum. Legumina chartacea, ovata, rostrata, vesicaria, eo 20 mm lg. 15 mm lt., molliter albo-pilosa, subunilocularia.

Т у п у с : China, montes Kuku-Syrche (Przewalski), (LE!).

С п е ц и м и н а е x s a м и н а т а : Kasachstania orientalis, montes Monrak

(Smirnow et Antonyuk, 23.05.2000).

Многолетнее травянистое растение с веретеновидным корнем и немногочисленными очень плотнособранными укороченными стеблевыми побегами, одетыми остатками отмерших листовых черешков. Прилистники ланцетные, пленчатые, у основания сросшиеся с черешком, реснитчатые, наружные бело-прижато-волосистые, внутренние голые, по краям усаженные длинными прямыми белыми волосками. Листья 4–12 см дл. на крепких щетинисто-волосистых черешках, остающихся некоторое время и после опадения листочков. Листочки в числе 3–6 пар, ланцетовидные либо линейно-ланцетовидные, острые, 7–25 мм дл. и 1.5–4 мм шир. покрыты длинными белыми прилегающими либо отклоненными волосками. Цветочные стрелки прямостоячие, короче либо равны листьям, густо покрыты белыми оттопыренными волосками. Цветки в числе 3–6 в рыхлых головках. Прицветники линейно-ланцетные, короткие (немного длиннее цветоножки), щетинисто-волосистые. Чашечка трубчатая, с хорошо заметной более темной жилкой, при плодах немного вздутая и разрывающаяся (около 10 мм дл.), покрытая длинными белыми отстоящими волосками, черные полностью отсутствуют. Зубцы чашечки треугольно-линейные, щетинисто-волосистые, равны почти половине трубки. Венчик ярко-желтый. Флаг широко-эллиптический на верхушке цельный, у основания довольно быстро суженый в широкий ноготок (почти равный отгибу). Длина флага около 20 мм и ширина около 10 мм. Крылья почти равны флагу, пластинка их на верхушке цельная. Лодочка серповидная, с длинным шиловидным носиком, немного короче крыльев или почти равна им. Завязь сидячая волосистая, с 10–15 семяпочками. (Бобы тонкокожистые, яйцевидные, вздутые около 20 мм дл. и 15 мм шир., с острым треугольным носиком, опушенные белыми немного оттопыренными волосками, почти одногнездные, но с хорошо заметным брюшным швом.).

Т и п : Синьцзянь, [Джунгарская Гоби], горы Куку-Сырхэ, Прж. (LE!).

И с с л е д о в а н н ы е э к з е м п л я р ы : Казахстан, Вост.-Казахстанская обл., Зайсанский р-он, хр. Монрак, 10 км на запад от пос. Кенгай (Мичуринское); 47°26'с.ш. и 84°42'в.д., каменистые склоны, Смирнов С.В., Антонюк Е.В., 23.05.2000г.

#### ЛИТЕРАТУРА

**Васильченко И.Т., Федченко Б.А.** Род Остролодочник – *Oxytropis* DC. // Флора СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – Т. 13. – С. 1–229.

**Семиотрочева Н.Л.** Род Остролодочник – *Oxytropis* DC. // Иллюстрир. опр. раст. сем. Бобовых Казахстана.-Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962.-С. 237-281.

**Байтенов М.С.** Род Остролодочник – *Oxytropis* DC. // Флора Казахстана. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. – С. 330–411.

**Филимонова З.Н.** Род Остролодочник – *Oxytropis* DC. // Опр. раст. Ср. Азии. – Ташкент: Изд-во «ФАН», 1983. – С. 323–368.

**Грубов В.И.** Род Остролодочник – *Oxytropis* DC. // Раст. Центр. Азии. – С-Пб.: Изд-во “Мир и семья-95”, 1998. – С. 88.

---

**Komarov V.L.** Novitates Asiae orientalis. // Feddes Repertorium. 1914, Bd. 13. – S. 233.

**SAMMARY**

A complete diagnosis of *O. setifera* Kom. previously known only in type (China) is given. This species is also new for Kasakstan.

Алтайский государственный университет  
г. Барнаул

Получено 09.01.2001 г.