

УДК 582.893(571.15)

И.Н. Чубаров

I. Tshubarov

**РЕДКИЕ И НОВЫЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА APIACEAE Lindl. ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ****RARE AND NEW TYPES OF FAMILY APIACEAE Lindl. FOR TERRITORY  
OF ALTAI REGION**

В статье приводятся сведения о находке редкого для Алтайского края вида *Vupleurum scorzonerifolium* Willd и нового для этой территории вида *Vicatia atosanguinea* (Kar. et Kir.) P.K. Mukh. et M. Pimen.

*Vupleurum scorzonerifolium* Willd. – это по преимуществу восточносибирское растение, с ареалом захватывающим часть Средней Сибири, Восточную Сибирь, Китай, Монгольский Алтай, Дальний Восток, Японию. Основной ареал данного растения приходится на Туву. Здесь это растение встречается зачастую в тех же местообитаниях, что и другой вид – *Vupleurum bicaule* Helm, однако в общем данный вид предпочитает все же менее петрофильные почвы и по своим анатомо-физиологическим характеристикам имеет более мезоморфное строение.

На территории Алтайского края известен всего лишь один достоверный сбор, сделанный Б.М. Козо-Полянским в начале нашего века около с. Урюпино Алейского р-на. В последствии, после работ П.Н. Крылова, большинство ботаников приводит данный вид для территории Алтайского края, ссылаясь на второстепенный источник – Флору Западной Сибири (1932). Каких-либо повторных сборов до настоящего времени на территории Алтайского края не производилось.

Нами данный вид был найден в 1998 году: Алтайский край, Усть-Пристанский р-н., 5км. вверх по прав. бер. р. Обь. от с. Чеканиха, 52°22' с.ш., 83°58' в.д., опушка соснового бора. 28 августа 1998 г. Чубаров И. Данное растение имеет несколько мезоморфизированный облик по сравнению с аналогичными образцами из республики Тува. Географически обе точки сбора на территории Алтайского края находятся в непосредственной близости, с примерно одинаковыми почвенно-климатическими условиями. Учитывая пространственное положения данных точек сбора относительно основного ареала этого растения, можно сказать, что на данный момент именно здесь проходит западная граница данного вида. Современная дизъюнкция ареала *Vupleurum scorzonerifolium* Willd по видимому возникла в результате климатических изменений, происходящих в четвертичный период. Предположение о случайном заносе, *Vupleurum scorzonerifolium* Willd. на эту территорию являются неубедительными.

Вид внесён в красную книгу Алтайского края, каких-либо конкретных мер по его охране не принимается.

Летом 1996 года ходе экспедиции ЮСБС на территории Солонешенского

района, в верховьях и в среднем течении реки Шинок был найден редкий для Алтая и новый для Алтайского края вид – *Vicatia atosanguinea* (Kar. et Kir.) P.K. Mukh. et Pimen.

Ареал *Vicatia atosanguinea* охватывает Гималаи, Западный Китай, горы Средней Азии, часть Казахстана; в Западной Сибири он встречается на территории Кемеровской области и Республики Алтай. На протяжении с 1997 по 1999 г. этот вид нами собирался на территории Республики Алтай в Чуйских хребтах и на плоскогорье Укок.

В Алтайском крае данный вид был найден в следующих точках: Алтайский край, Солонешенский р-н., среднее течение р. Шинок, 51°22' с.ш., 84°35' в.д. ТАШ № 2541. 21 июня 1996 г. Камелин Р.В., Шмаков А.И., Смирнов С., Соловьёв А., Косачёв П., Тихонов Д., Герман Д., Антонюк Е.; Солонешенский р-н., верхнее течение р. Шинок, 51°21,5' с.ш., 84°34', в.д., скалы. 18 июня 1996 г. Шмаков А.И. Дурников Д. Собранные экземпляры имеют небольшую высоту и несколько меньшую листовую пластинку по сравнению с аналогичными растениями, собранными на территории Республики Алтай.

Собранный гербарный материал хранится в гербарии ЮСБС.

Находка *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. и *Vicatia atosanguinea* (Kar. et Kir.) P.K. Mukh. et M. Pimen., на территории Алтайского края расширяет наши знания о современном состоянии ареала этих видов.

#### ЛИТЕРАТУРА

**Крылов П.Н.** Флора Западной Сибири. – Томск, 1932. – Т. 8. – С. 1819–2087.

**Тюрина Е.В., Гуськова И.Н., Валуцкая А.Г.** Зонтичные Южной Сибири как материал для интродукции. – Новосибирск: Наука, 1976. – 252 с.

**Пименов М.Г.** Семейство *Ariaceae* Lindl. – Зонтичные // Флора Сибири Т.10 *Geraniaceae–Cornaceae*. – Новосибирск: Наука, 1996. – С. 123–194.

**Линчевский И.А.** Род *Bupleurum* L. – Володушка // Флора СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 16. – С. 310–312.

**Шишкин Е.П.** Род *Carum* L. – Тмин // Флора СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1950 – Т. 17. – С. 385–396.

#### SUMMARY

Data about finding in Altai regeon (Altaiskii krai) of rare species *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. and new for this territory species *Vicatia atosanguinea* (Kar. et Kir.) P.K. Mukh. et M. Pimen. are adduced.