

НОВЫЕ ТАКСОНЫ

УДК 582.951.6(235.223)

Н. В. Степанов

N. Stepanov

**НОВЫЙ ВИД РОДА HIERACIUM СЕКЦИИ PRENANTHOIDEA KOCH
(ASTERACEAE) ИЗ ЧЕРНЕВОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОГО САЯНА**

**A NEW SPECIES OF GENUS HIERACIUM OF SECTION PRENANTHOIDEA
KOCH (ASTERACEAE) FROM CZERN TAIGA OF THE WEST SAYAN**

Дается описание нового вида рода Hieracium из Западного Саяна.

Hieracium nasimovae Stepanov sp. nov. - Caulis 80-140 cm altus, superne pilis stellatis. Folia radicalia sub anthesin nulla; caulina 17-33 (coefficienti filiationis 0.2-0.3), media et superiora lanceolato-ovata (subpandurata) ad 15 cm lg., 4 cm lt., sessilia, basi subcordata vel rotundata, ab utroque latere dentibus 3-4 armata, supra et subtus stellato-pubescentia, marginibus pilis stellatis et aculeatiformibus obsita. Inflorescentia paniculata (calathidiis 1-26); pedunculi tomentosi. Involucrum 7-12 mm lg.; involucri phylla viridia, exteriora fimbriata, glandulis nigris (38-80) 0.1-0.5 mm lg. densis et pube stellata vestita.

Т у п у s: Sajan Occidentalis, pars boreali-orientalis, jugum Kulumys, 10 km ad meridiem ab pago Tanzybej, fl. Vtoraja Belaja, systema fl. Bolschoj Kebesh, regio ripae sinistrae adjacens; glareosa riparia, magniherbetum et fruticetum in taiga subnemorosa, 500 m s. m. 16.VIII.1997, N. V. Stepanov, (KGU, isotypi - LE, NS, SSBG, KRAS).

A f f i n i t a s. A *H. kusnetzkiensi* Schischkin et Serg. magnitudinibus, caractere indumenti foliorum et involucri differt.

Стебель 80-140 см выс., в верхней части звездчатоопушенный. Прикорневые листья ко времени цветения отсутствуют; стеблевых листьев 17-33 (коэффициент олиственности 0.2-0.3), средние и верхние яйцевидно-ланцетные (почти скрипковидные) до 15 см дл., 4 см шир., сидячие, в основании слабо сердцевидные или закругленные, с 3-4 зубцами с каждой стороны, сверху и снизу со звездчатым пушком, по краям со звездчатыми и шипиковидными волосками. Соцветие метельчатое (от 1 до 26 корзинок); цветоносы войлочные. Обертка 7-12 мм дл.; листочки оберток зеленые, наружные бахромчатые, с частыми черными железками (38-80) 0.1-0.5 мм дл. и звездчатым пушком.

Т и п: Северо-восточная часть Западного Саяна, хребет Кулумыс, 10 км южнее пос. Танзыбей, р. Вторая Белая левобережной части бассейна р. Большой

Кебеж, приусловые галечники, крупнотравье и заросли кустарников в черневой тайге, абс. выс. 500 м. 16.VIII.1997. Н. В. Степанов. (KGU, изотипы - LE, NS, SSBG, KRAS).

Р о д с т в о: От *H. kusnetzkiense* Schischk. et Serg. отличается крупными размерами, характером опушения листьев и обертки.

Вид назван в честь сибирского ботаника, географа Дины Ивановны Назимовой.

SUMMARY

The description of new species of genus *Hieracium* from czern taiga of West Sayan is presented in this article.

Красноярский государственный университет,
г. Красноярск

Получено 18.12.1997.