

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

УДК 582.6(571.1/5)

Т.А. Терехина

T. Terekhina

ASCLEPIAS SYRIACA L. – НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ СИБИРИ

ASCLEPIAS SYRIACA L. – A NEW SPECIES FOR THE SIBERIA FLORA

Приводится новый вид для флоры Сибири – *Asclepias syriaca*, отмеченный в северо-восточной части предгорий Алтая.

При проведении экспедиционных работ летом 1997 года в северо-восточной части предгорий Алтая на территории Красногорского района Алтайского края в деревне Тайна и ее окрестностях были обнаружены заросли растения, привлекавшие внимание мощно развитыми травянистыми стеблями и крупными листьями. Как удалось установить позднее, собранные растения оказались представителями нового для флоры Сибири натурализовавшегося рода *Asclepias* L. (*Asclepiadaceae* R. Br.) – *A. syriaca* L. (Победимова, 1952, 1978).

***Asclepias syriaca* L.** 1753, Sp. Pl. : 214, p. p., excl. syn. *Apocynum syriacum* Clus; Побед. 1952, Фл. СССР, 18 : 669; Висюл. 1958, Фл. УРСР, 8 : 273; Markgraf, 1972, Fl. Europ, 3 : 70; Побед. 1978, Фл. Евр. части СССР, 3 : 52. – **Ластовень сирийский.**

Многолетнее растение с простыми, толстыми стеблями до 150 см выс., рассеяно опушенными короткими курчавыми волосками и, кроме того, с широкой густой полоской такого же опушения вдоль всего стебля, верхние междоузлия беловатые от густого опушения; листья продолговато-эллиптические, 13–20 см дл., 7–9.5 см шир., коротко остроконечные, округлые или слабо сердцевидные при основании, с толстой средней жилкой, снизу беловатые от густого войлочного опушения, сверху с рассеянными волосками, коротко черешковые. Зонтики многоцветковые; цветоносы в 2.5 раза длиннее цветков, пушистые; цветы крупные, розовые, доли чашечки отклоненные, яйцевидные, длиннозаостренные, пушистые; венчик почти до основания надрезанный, лопасти его овальные, 6–7 мм дл., немного суженные к вершине, тупые, снаружи курчаво белопушистые. Листовки толстые, эллиптические, 6–10 см дл. 1.5–2.5 см шир., беловатые от густого

опушения (рис. 1).

Т и п: Сев. Америка (“in Virginia”).

Зап. Сибирь (Алт. – Алтайский кр., Красногорский р-он, окр. с. Тайна). – Одичавшее; берега ручьев, овраги. – **Общ. распр.:** Украина (одичавшее), Молдавия (одичавшее), Белоруссия (одичавшее), Кавказ (одичавшее), Казахстан (юго-вост., одичавшее), Средиз. (в культуре), Малоаз. (в культуре), Сев. Ам.

Гербарные образцы собранных растений хранятся в Гербарии ЮСБС АГУ (SSBG).

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы “Интеграция”(рег. № 123).




Рис. 1. *Asclepias syriaca* L.: а – лист, б – плод

ЛИТЕРАТУРА

Победимова Е.Г. Род Ваточник – *Asclepias* L. // Флора СССР. – М.–Л., 1952. – Т. 18. – С. 669–670.

Победимова Е.Г. Род Ластовень – *Asclepias* L. // Флора Европейской части СССР. – М.–Л., 1978. – Т. 3. – С. 52.

SUMMARY

The new species *Asclepias syriaca* for flora of Siberia marked on the north-eastern part of the Altai foot-hills is resulted.